

# Q & A QUESTIONS & ANSWERS ABOUT TUBERCULOSIS

د تيركولوز په اړه پوښتنې او ځوابونه



Centers for Disease  
Control and Prevention  
National Center for HIV/AIDS,  
Viral Hepatitis, STD, and  
TB Prevention



# QUESTIONS & ANSWERS ABOUT TUBERCULOSIS 2021

## د تیرکولوز په اړه پوښتنې او ځوابونه



د تیرکولوز په اړه پوښتنې او ځوابونه کې د (TB) د درملنې تشخیص او ناروغی په اړه معلومات ر. دا کتاب هغه خلکو لپاره دی چې د TB ناروغی باندې اخته دي هغه خلک چې ممکن د TB سره یو چا ته کتلې وي شوي وي هغه خلک چې د TB لپاره لوړ خطر لرونکي ناروغانو لپاره خدمات وړاندې کوي لکه اصلاحي افسران، د کور بې کوره کارگران، او بیړني ځواب ورکونکي؛ او همداراز هغه خلک چې غواړي د (TB) په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. د (TB) رو معلومات لپاره د [CDC](#) ویبپاڼې ته مراجعه وکړی.

د متحده ایالاتو د روغتیا او انساني خدماتو څانګه د ناروغی کنټرول او مخنیوي مرکزونه

د HIV/AIDS ملي مرکز،

د څاري هیپاتایټس،

د STD، او د نري رنځ به (TB) د له مینځه وړلو څانګه

# فهرست



4. TB څه ته وايي؟
4. ولي TB يا تيرکولوز لاهم په متحده ايالاتو کې يوستونزمنه ناروغي ده؟
4. تيرکولوز يا (TB) څنگه خپور شو؟
5. څوک د TB ناروغي د اخته کېدو په خطر کې دی؟
5. (LTBI) او TB څه توپير دی؟
6. د TB ناروغي څه ته وايي؟
7. څوک د TB ناروغي خطر لري؟
8. د TB ناروغي علايم کومې يا څه دي؟
9. د (LTBI) يا TB تر منځ څه تيرپير دی؟
10. ايا زه د TB معاينات وکړم؟
10. د TB لپاره کوم معاينات موجود دي؟
12. څه وکړم که چرته زما د TB معاينات مثبت وي؟
12. څه به پيښ شي چې زه د (bacille) کالمېټ-گورين (BCG) سره واکسين وکړم؟
13. که ه د نري رنځ (LTBI) انتان يا (انفيکشن) ولرم، زه څنگه کولى شم د TB ناروغي خپرېدومخه ونيسم؟
14. د latent TB infection (LTBI) ناروغي لپاره درمل استفاده کول څه جاني عوارض لري؟
16. څه وکړم که زه د HIV انتان ولرم؟
16. که چرته ما کې (TB) معلوم شي، ايا زه (TB) ناروغي بل چا ته خپرولى شم؟
17. د TB ناروغي درملنه څنگه کولى شو؟
18. د TB ناروغي درملو جاني عوارض څه دي؟
19. ولي بايد زه د TB درمل د وخت لپاره استفاده کړم؟
19. د بېلا بېلو درملو مقاومت لرونکي (MDR TB) او په پراخه کچه د درملو مقاومت لرونکي (XDR TB) څه شى دي؟
20. مستقيم مشاهده شوى درملنه (DOT) څه ته وايي؟
21. زه څنگه دا په ياد ولرم چې زما د TB درمل استفاده کړم که زه په DOT کې نه يم؟
22. زه څنگه کولى شم چې د TB ناروغي د خپرېدو څخه مخنيوى وکړم؟
23. د (TB) ناروغي نورې سرچينې.

## (TB) څه ته وايي؟

د TB ناروغی د *Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis)* باکټريا له امله رامینځته کېږي. باکټريا يا میکروبونه معمولاً په سپرو برید کوي. د (TB) میکروب کولی شي د بدن هرې برخې باندې برید وکړي، لکه پښتورگي، نخاع يا مغز.

ښه خبره یه لاره دی هغه خلک چې په TB اخته وي درملنه یې کیدی شي که دوی طبي مرستې او وسایل وکاروي.

## ولي (TB) لاهم په متحده ایالاتو کې یوه ستونزمنه ناروغي ده؟


د TB ناروغي د مخنيوي او درملني وړ ده مگر د نړۍ ترټولو زیاته وژونکی او ساري ناروغي هم ده. ساري ناروغي (TB) درلودل پدې معنی ده چې تاسو نورو ته د TB میکروبونه خپروئ. په تیرو څو کلونو کې، متحده ایالاتو کې تر ټولو کم د TB ناروغي پېښې ثبت شوي دي، خو ډیرې خلک لاهم د TB په ناروغي اخته دي. حتی د شمیر په کمیدو سره لا هم د TB ناروغي یوه ستونزه ده پداسې حال کې چې په متحده ایالاتو کې د TB د پېښو شمیر ټیټ شوی، د ځینو اشخاصو په پرتله د توکمیز او توکمیز اقلیت گروپونو کې د TB کچه لاهم لوړه ده. داځکه چې ځینې نژادي او قومي گروپونه د TB د خطر فاکتورونو لري چې کولی شي د ناروغي پراختیا په خپرېدو چانس

ډیر کړي اوگوری [7 پايه](#)

دا کتابچه د TB ناروغي په اړه عام پوښتنې ځوابوي. مهرباني وکړئ له خپل ډاکټر، نرس، یا نورو روغتیا پاملرنې چمتو کونکي څخه پوښتنه وکړئ که تاسو اضافي پوښتنې لرئ.

## د TB ناروغي څنګه خپرېږي؟

د TB ناروغي د هوا له لارې یو انسان څخه بل انسان ته انتقالېږي. د TB میکروب په هوا کې خپرېږي کله چې یو څوک د سپرو یا ستوني په ساري ناروغي اخته وي توخې کوي، خبرې کوي یا شور کوي. نږدې ممکن عام وکړي د TB میکروبونو کې تنفس وکړي او په ناروغي اخته شي.



## څوک د (TB) ناروغی په خطر کې دی؟

هر وګړی په ټي بي اخته کېدی شي. خو ځیني خلکو ته د ټي بي اخته کېدو ډېر خطر وي.

« په ځانګړي ډول هغه خلک چې د ټي بي ناروغانو سره ډېرې اړیکې لري.

« هغه وګړي چې ټي بي ناروغی لرونکی هېواد کې زیږیدلي وي یا ټي بي هغو هیوادونو ته سفر کړي وي چېرې چې د ټي بي

ناروغی عامه ده، لکه مکسیکو، فیلیپین، ویتنام، هند، چین، هېټي، ګواتیمالا او نور هیوادونه او داسې نور هیوادونه چې د ټي

بي ناروغی کچه پکې لوړه وي.

« همداراز د روغتیا پاملرنې کارګران او نور وګړي کوم چې ټي بي د ژر منتقلېدو ځایونو کې کار یا ژوند کوي، لکه بي کوره

سرپناه، زندانونه، او د نرسنگ مرکزونه.

## د (TB) انفیکشن یا (LTBI) څه ته وايي؟

ډیری وګړي چې د TB میکروبونو کې تنفس کوي او په ناروغی اخته کېږي، بدن ټي بي د ډي ورتیا لري چې د TB میکروبونو سره مبارزه

وکړي او له نورې ودې ټي بي مخه ونیسي. د TB مېکروب غیر فعالیږي، مګر دا په بدن کې ژوندي پاتې کېږي او وروسته فعال کېدی شي.

دې ته (Latent TB) ویل کېږي او یا LTBI په لنډ ډول.

د LTBI ناروغی لرونکي وګړي

« هیڅ علايم نه لري.

« دوی نه ناروغه کېږي.

« او نه هم د (TB) مېکروب ورڅخه خپریږي.

« معمولا د TB ویني مثبت معاینات لري یا د TB پوټکي مثبت عکس العمل لري.

« ممکن د (TB) ناروغی باندې اخته شي. که دوی د LTBI درملنه ونکړي (13) [پاڼه اوګوري](#).

هغه وګړي چې د (LTBI) نښې ونلري دوی نشي کولی چې نورو ته د (TB) میکروبونه خپور کړي. څوک د نري رنځ میکروبونه په

بدن کې فعال شي او تقسیم شي، نو دغه وګړی به د (LTBI) درلودو څخه به د (TB) ناروغی باندې اخته شي. نو له همدې امله باید د

(LTBI) ناروغی درملنه ژر وشي تر څو د (TB) ناروغی څخه وژغورل شي. په متحده ایالاتو کې د TB کنټرول لپاره د LTBI درملنه

اړینه ده ځکه چې دا د پام وړ خطر کموي چې LTBI به د TB ناروغی ته وده ورکړي.




## د TB څه ته وايي؟

که چيرې د معافيت سيستم د (TB) میکروبونو د ودې مخه ونه نیسي، د TB میکروبونه په بدن کې تقسیمېږي او د (TB) ناروغی لامل کیږي. د (TB) میکروبونه په بدن برید کوي، او که دا سږو ته لاړ شي، د (TB) میکروب کولی شي په سږو کې سوری وکړي. د ځینې وگړو په بدن (TB) اخته کیدو وروسته په اونيو کې وده کوي مېنکي لږې نه چې د ده بدن د (TB) مېکروبونو سره مبارزه وکړي. هغه وگړي چې د (LTBI) په ناروغی اخته وي ممکن کلونه وروسته په (TB) اخته شي، کله چې د دوی د معافیت سيستم د بل څه له امله ضعیف شوی وي. د (LTBI) درملنه د (TB) مخنیوي لپاره مؤثره تماميږي.

هغه وگړي چې د سږو یا ستوني تي بي ناروغي لري ښايي دوی د (TB) میکروب خپلې کورنی، ملگرو او نورو شاوخوا خلکو ته انتقال کړي. هغه وگړي چې د بدن نورو برخو کې په (TB) اخته وي، لکه پښتورکي یا نخاع، معمولاً نورو خلکو ته نه انتقالیږي.

هغه وگړي چې د (TB) ناروغان وي او نور خلک ورسره ډېروخت تېروي ممکن په دغه ناروغی ژر اخته شي. په دې کې د کورنی غړي ملگري، همکاران او همصنفيان شامل دي.

کله چې د تي بي درملنه کوي باید بېلا بېل درمل استفاده کړي. د څو اونيو لپاره د (TB) درملو اخیستو وروسته، ډاکټر د TB ناروغانو ته ویلی شي چې د دوی د (TB) مېکروب نور نورو خلکو ته نه انتقالیږي. ډېری د (TB) ناروغان باید شپږ میاشتي د (TB) درمل استفاده کړي تر څو و سمه درملنه پي وشي.



## د (TB) ناروغی خطرات څه دي؟

ډیری وګړي داسې هم شته چې (LTBI) لري. هیڅکله د (TB) ناروغي وده پکې نه کوي. پداسې حال کې چې د (LTBI) لرونکي وګړي هر وګړی په (TB) نه اخته کیږي. خو نږدې 10-5% پوري وګړي که چرته درملنه ونکړي نو ښايي په (TB) ناروغی اخته شي. داسې اټکل کیږي چې په متحده ایالاتو کې 80% پېښې هغه ناروغانو ثبت شوي چې د (LTBI) درملنه یې نده شوي له همدې امله TB ناروغی باندې اخته شوي دي. ځیني وګړي چې (LTBI) لري ډېر امکان لري چې په (TB) ناروغی باندې اخته شي. هغه وګړي چې د (TB) په ناروغی اخته کېدو ډېر خطر لري په دوه کټګوريو وېشل شوي:

1 هغه وګړي چې اوسمهال د (TB) په مېکروبو باند اخته دي

2 هغه وګړي چې داسې ناروغی لري چې د معافیت سستم ورته ضعیف یا (کمزوری) کوي لکه:

د (HIV) انتان یا (infection)

د درملو کارول (لکه د پیچکاری درملو کارول)

د (Rheumatoid) (arthritis) یا (Crohn's) ناروغی لپاره تخصصي درملنه

د ارګانونه عملیاتونه

د پښتورګو جدي ناروغي لرونکي

د سر او غاړي سرطان

شکر ناروغان

طبي درملنه لکه (corticosteroids)

سیلیکوسیس یا (Silicosis)

کم وزن لرونکي

هغه کوچنيان چې د 5 کالو څخه کم عمر لري ډېر خطر لري چې د (TB) ناروغی پکې ژر وده وکړي چې کله پرې اخته شي.

## د (TB) ناروغی علامه څه کیدای شي؟

د (TB) ناروغی علامه دې پورې اړه لري چې د انسان د بدن په کومه برخه کې د (TB) مېکروب پرمختګ کوي. په سږو کې د (TB) ناروغی ممکن لاندې علامه ولري.




د سینې درد



د وینې یا بلغم ټوخی  
(د سږو دننه بلغم)



ټوخی  
(د 3 اونيو څخه  
ډیر دوام کوي)



زکام



خولې



تبه



د وزن کمېدل



ستريا او کمزورتيا



اشتها ختمېدل

د بدن په نورو برخو کې د (TB) ناروغی علامه په لاندې ډول دي:

« د پښتورگو (TB) ممکن په ادرار کې د وینې لامل شي.

« د مننژيټس (TB) ممکن د سر درد یا نورې ګډوډې لامل شي.

« د نخاع (TB) ممکن د ملا درد لامل شي.

« د غشا (TB) ممکن د دروندوالی لامل شي.

نورو معلوماتو لپاره چې د (TB) ناروغی درملنه باید څنګه کيږي وګوري [17 پاڼې](#).



## د (TB) ناروغی او (LTBI) تر منځ څه توپیر دی؟

د (TB) ناروغی او (LTBI) انتان تر منځ ډېر مهم توپیر دی. د (TB) ناروغی او (LTBI) ترمنځ توپیر باندې پوهېدل تاسو سره مرسته کوي. چې تاسو پوه شئ چې تاسو په (LTBI) اخته یاست که په (TB). لاندې جدول د دواړو ناروغیو تر منځ توپيرونه یو په یو تشریح کوي.

 <b>هغه وگړی چې (TB) ناروغی لري.</b>	 <b>هغه وگړی چې (LTBI) لري.</b>
<p>کوم وگړي کې چې زیات شمېر فعال د (TB) ناروغی مېکروب وي</p>	<p>کوم نارینه یا ښځې کې چې د (TB) مېکروب کم وي او ژوندي وي خو فعال نه وي</p>
<p>علايم لري لکه</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>« سخت ټوخی لري کوم چې درې اونۍ دوام وکړي.</li> <li>« د سینې درد لري</li> <li>« په ټوخی کې د بلغم اخراج لري</li> <li>« سترتیا او کمزورتیا</li> <li>« وزن کمېدل</li> <li>« اشتها نه لري</li> <li>« زکام</li> <li>« تبه</li> <li>« د شپې ډېر خولې کول</li> </ul>	<p>علايم نه لري</p>
<p>ښايي د (TB) مېکروب نورو ته منتقل شي</p>	<p>د (TB) مېکروب نورو ته نشي انتقالېدی.</p>
<p>ښايي د ناروغی احساس وکړي او ځینې علايم هم ولري. لکه ټوخی تبه</p>	<p>د ناروغی احساس نه کوي</p>
<p>معمولا د (TB) پوټکي مثبت معاینات یا د (TB) بلډ با ویني معاینات د (TB) انتان یا (infection) ښيي</p>	<p>معمولا د (TB) پوټکي مثبت معاینات یا د (TB) بلډ با ویني معاینات د (TB) انتان یا (infection) ښيي</p>
<p>معمولا د سینې د اېکسري معاینات ېې نورمال نه وي او مثبت (sputum smear) لري</p>	<p>د سینې اېکسري معاینات ېې نورمال وي او یو منفي (sputum smear) لري</p>
<p>د (TB) د ناروغی درملني ته اړتیا لري</p>	<p>باید د (LTBI) درملنه وکړي تر څو د (TB) ناروغی څخه ېې مخنیوی وشي</p>

## ایا زه د (TB) معاینات وکړم؟

ته د (TB) معاینات تر سره کړه که چرته:

- « تا داسې خلکو سره وخت تېر کړی وي چې د (TB) ساري ناروغي ېې تېره کړې وي او يا هم د (TB) مريض وي.
- « که تاسو داسې هېوادونو کې زيږيدلي ياست يا مو سفر کړی وي چېري چې (TB) ناروغي عامه وي، پشمول د مکسيکو، فيليپين ویتنام، هند، چین، هاپتي او گواتيمالا.
- « چرته چې تاسو ژوند کوی. او يا مو ژوند کړی وي. او يا هم داسې ډله کې ناسته کوی چېري چې د (TB) ناروغي عامه وي. لکه زندان، د نرسنگ مرکز او سرپناه خايونه.
- « که تاسو د روغتيا پاملرني کار کونکی ياست چې د (TB) لرونکي ناروغی ناروغانو پاملرنه کوي.
- « که ته د يو داسې ټولني غړی ېې چې هلته د (LTBI) يا (TB) ناروغيو ناروغان يا مريضان وي او روغتيايي وسايل نه لري، عايد ېې کم وي، او يا د دوايي توکو او الکولو غلط استفاده کيږي.
- سر بيره پردی هغه کوچنيان چې له 5 کلونو څخه کم عمر لري. د (TB) ناروغی وده ېې په بدن کې زر کيږي کله چې پری اخته شي. له همدې امله د هغه کوچنيانو د (TB) معاینات ډېر مهم دي کوم چې له داسې وگړو سره پاتي شوی وي چې د (TB) ناروغي پکې رابنکاره شوی وي.

## د (TB) ناروغی لپاره کوم معاینات ضروري دي؟

د (TB) ناروغی لپاره دوه ډوله معاینات شتون لري: د TB ویني معاینه او د (TB) پوستکي معاینه. ستاسو د روغتيا پاملرني کارکونکي د (TB) ناروغی لپاره کوم د (TB) معاینات غوره کړي. فاکتورونه چې بايد د معایناتو په وخت کې نظر کې ونيول شي. د معایناتو دليل، د معایناتو شتون او لگښت. د روغتيا پاملرني کارکونکي هڅول کيږي چې د (TB) د ویني نوي معاینات استفاده کړي ترڅو د (TB) معاینه په سمه توگه تر سره شي. عموماً دې ته اړتيا نه وي چې يو وگړی دې د (TB) د ویني او پوستکي دواړه معاینات تر سره کړي.

### د (TB) ویني معاینه



د (TB) ویني معاینه د دې لپاره تر سره کيږي چې معلوم شي چې ایا ته په (TB) ناروغی اخته ېې که نه. د (TB) د ویني دوه معاینات د متحده ایالاتو د خوارو او درملو اداري لخوا تصویب شوي او په متحده ایالاتو کې اوسمهال شتون لري.

« QuantiFERON®-TB گولډ پلس (QFT-Plus)

« T-SPOT®.TB معاینات (T-Spot)

تاسو کولی شی چې د (TB) د ویني معاینات روغتیايي مرکز یا د ډاکټر دفتر کې ترسره کړی. د روغتیا پاملرنې کار کونکي به له تاسو څخه وینه واخلي یو لابراتوار ته به یې ولېږي او نتیجه به تر لاسه کړی. که ستاسو د روغتیا څانګه د (TB) د ویني معاینه استعمال کړي، نو یوازې یو وار تګ ته بیا اړتیا لری.

**مثبت د (TB) معاینات:** معنی دا ده چې تاسو (TB) په ناروغی اخته یاست. تاسو ته د ځینو نورو معایناتو کولو ته هم اړتیا شته. دې معایناتو سره به تاسو ته معلوم شي چې ایا تاسو په (LTBI) باندې اخته شوي یاست که په (TB) ناروغی.



**منفي د (TB) د ویني معاینه منفي د (TB) ویني معاینې معنی دا ده چې تاسو د (TB) په ناروغی اخته نه یاست.**



د (TB) د ویني معاینه د هغو وګړو لپاره وړاندیز شوی.

« هغه وګړي چې د (TB) bacille Calmette–Guérin (BCG) واکسين ېې کړي وي.

« هغه وګړي چې د (TB) پوستکي معاینې ته د عکس العمل موندلو لپاره د دوهم ځل وخت اخیستلو کې مشکلات ورته مواجه شوی وي.

## د (TB) د پوستکي معاینه



د (TB) د پوستکي معاینه ښایي د دې لپاره تر سره شي تر څو معلوم کړي چې ایا تاسو ته د (TB) میکروبو خو ندي اخیستي. تاسو خپل د پوستکي معاینات د روغتیا مرکز یا د ډاکټر کلینک کې ترسره کولی شی. د روغتیا پاملرنې کار کونکي به ستاسو د لاس ښکته برخې پوټکي ته د ازموینې مایع (د ټوریکولین یا PPD په نوم یادېږي) داخل کړي. د 2 یا 3 ورځو وروسته، تاسو باید بیرته راشئ ترڅو ستاسو د پوټکي ازموینه د روغتیا پاملرنې کار کونکي لخوا ولولئ. تاسو ممکن پړسوب ولری چېرې چې تاسو د (tuberculin) پیچکاری کړی وي. د روغتیا پاملرنې کار کونکي به دا پړسوب اندازه کړي او تاسو ته به ووايي چې د معایناتو ته ستاسو عکس العمل مثبت دی که منفي.

**مثبت د پوستکي معاینات:** دا معنی لري چې دغه بدن ته د (TB) میکروب ورسېدلي دي. تاسو ته د ځینو نورو معایناتو کولو ته هم اړتیا وي معایناتو سره به تاسو ته معلوم شي چې ایا تاسو په (LTBI) باندې اخته شوي یاست که په (TB) ناروغی.



**منفي د پوستکي معاینات.** دا پدې معنی ده چې د وګړي بدن معایناتو ته عکس العمل ندي ښودلی. او د (LTBI) یا (TB) ناروغي احتمال نلري



که ستاسو د (TB) میکروبوونه وروستي وي ، ستاسو د (TB) پوستکي ازموینې عکس العمل ممکن لاهم مثبت نه وي. ښایي تاسو د (TB) مریض سره وخت تېرېدو وروسته 8 یا 10 اونی وروسته د پوستکي معاینې ته اړتیا پیدا شي. دا ځکه چې انتان یا (infection) څخه وروسته څو اونی نیسي چې ستاسود معافیت سیستم د (TB) پوټکي معاینې ته عکس العمل و ښایي. که دوهمې معاینې ته ستاسو عکس العمل منفي وي، ډېر احتمال دی چې ستاسو د (TB) انتان یا (infection) نشته.

## څه وګرم که زما د (TB) انتان معاینات مثبت وي؟

که تاسو د (TB) ویني یا د (TB) پوستکي معایناتو ته مثبت عکس العمل ولری ، نو ستاسو ډاکټر یا نرس به ستاسي نورمعاینات ترسره کړي ترڅو معلوم شي چې ایا تاسو د (TB) ناروغي خو نه لری. او دا معاینه شاید ستاسو د سپیني ایکسري اخیستل وي. شاید ستاسو د توخي بلغمو معاینات هم ترسره کړي. ځکه چې د (TB) میکروب ممکن ستاسو د سږو پرته بل چیري وموندل شي، ستاسو ډاکټر یا نرس ممکن ستاسو د (urine) یا ادرارو او د نسج نموني واخلي او یا هم د دې پرته ستاسو نورمعاینات ترسره کړي. که په وخت مو د (LTBI) انتان درملنه ونشي بنایي دا د (TB) په ناروغي بدل شي. که چرته تاسو د (LTBI) انتان سره مخ شی نو باید درملنه یې وکړی ترڅو د (TB) ناروغي مخنیوی وشي. وګوره (13 پاڼه). که چرته تاسو د (TB) په ناروغي اخته شی نو تاسو باید درمل استفاده کړی ترڅو ستاسو ژر تر ژره درملنه وشي. وګوری (7).


## څه به پيښ شي که ما د (BCG) bacille Calmette-Guérin واکسين کړي وي؟

(BCG) د (TB) واکسين دي. خو دا واکسين په متحده ایالاتو کې په پراخه کچه نه استفاده کېږي. او ډېرګري چې د امریکا څخه بیرون زېږېدلي دي د (BCG) واکسين یې استفاده کړي دي.

دا اکثراً په نورو هیوادونو کې کوچنیانو ته ورکول کېږي چې د (TB) ناروغي ډیره عام ده. دا واکسين په ډېری هیوادونو کې دې لپاره عامو وګړو ته ورکول کېږي ترڅو د (TB) بیلا بېلو ډولونو څخه یې مخنیوی وشي. د (BCG) (TB) واکسين فکر نه کېږي چې عام وګړي په سږو کې د (TB) ناروغي څخه وژغوري. کومه چې په متحده ایالاتو کې ترټولو عامه ناروغي ده.

په ځینو وګړو کې د (TB) (BCG) واکسين ممکن د (TB) پوتکي مثبتې معاینې لامل شي کله چې دوی د (TB) په میکروبونو نه وي اخته. په هرصورت د دې پوهیدو لپاره بله لاره نشته چې د پوتکي مثبت ازموینې عکس العمل د (BCG) واکسين کولو له امله رامینځته شوی او که د (TB) ریبینټیني انتان له امله رامینځته شوی. کله چې د پوتکي معاینه ګوری هغه وګړي چې د (BCG) واکسين یې کړي وي او یا هم چا چې د پوتکي ازمعاینه مثبت عکس العمل ولري باید نورهم د (TB) ناروغي لپاره وڅېړل شي. ځکه بنایي دوی د (BCG) واکسين نه وي اخیستي.

برعکس د (TB) پوتکي معاینه او د (TB) ویني معاینه مینکي د (BCG) واکسين کولو باندې اغیزه ونلري. له همدې امله د (TB) ویني معاینه هغه وګړو لپاره غورل وبلل شي چا چې د (BCG) واکسين کړي وي.



## که چرته ما ته (LTBI) انتان شوی وی نو زه څنگه د (TB) ناروغی د ودې څخه خان ژغورلی شم؟

که په وخت مو د (LTBI) انتان درملنه ونشي بنایي دا د (TB) په ناروغی بدل شي. که چرته تا ته (LTBI) شوی وي نو باید ته خپله د (TB) درملنه وکړي حتی که ته مریض هم نه بی. د (LTBI) درملنه د (TB) مخنیوي لپاره اړینه ده ځکه چې دا د پام وړ خطر کموي چې (LTBI) د (TB) ناروغی باندې بدله کړي.

د (LTBI) درملنه د (TB) ناروغی مخنیوي لپاره مؤثره تماميږي. د (LTBI) درملني لپاره مونږ سره څو لاري موجودي دي. اوسمهال د (LTBI) درملني لپاره لږ وخت ته اړتیا ده. کوم چې 6-9 پرځای اوس په 3-4 میاشتو کې کيږي. وروکې د (LTBI) درملني کورس اوږدمهاله کورس څخه ډېر محفوظ او مؤثره دی.

که تاسو (LTBI) لرئ نو تاسو د لوړ خطر لرونکې ډلې کې یاست و وگوره، [7 پاڼه](#) دا خورا ډیر عاجل دی چې تاسو درمل واخلي، نو تاسو به د (TB) ناروغی څخه وژغورل شي. لاندې درمل د (TB) لپاره استفاده کيږي. شاید ځینې نور د (LTBI) لپاره هم وي.



ریفامپین یا Rifampin (RIF)



ریفینتین یا Rifapentine (RPT)



ایسونایزید یا Isoniazid (INH)

(CDC) یا تیرکولوز د کنټرولرانو ټولني د (LTBI) لپاره لاندې انتخابونو څخه د یو درملني وړاندیز کړي.

« دري میاشتي په اونی کې یو وار د ایسونایزید Isoniazid یا ریفینتین Rifapentine (3HP) استعمال.

« څلور میاشتي هره ورځ د ریفامپین یا Rifampin استعمال.

« یا هم دري میاشتي هر ورځ ایسونایزید Isoniazid یا ریفامپین Rifampin (3HP) استعمال

که پورته درملنو څخه کوم دوز ستاسو لپاره انتخاب نه وي، د (LTBI) درملني مؤثر دوز شتون لري چې پکې 6 یا 9 میاشتي پوري ایسونایزید (isoniazid) تاسو استفاده کولی شئ. کله چې ایسونایزید (isoniazid) خیره کيږي. ستاسو ډاکټر ممکن تاسو د خپل درملو سره ویتامین B6 هم توسعه کړي. ستاسو ډاکټر شاید ستاسو د روغتیايي حالاتو ته په کتو سره تر ټولو مؤثره درملنه غوره کړي. ستاسو درملنه ممکن تعدیل شي که تاسو د هغه چا سره اړیکه کې وي چې د TB ناروغی د میکروبونو له امله رامینځته کيږي چې د ایسونایزید یا ریفامپین په وړاندې مقاومت لري، د LTBI او TB ناروغی درملني لپاره دوه خورا مهم درمل. د دې معنی دا ده چې دغه درمل شاید نور د (TB) میکروب نشي مړه کولی.

ځینې وخت د ناروغانو د (LTBI) درملنه کيږي که څه هم د دوی د (TB) د ویني معاینې پایله یا د (TB) پوټکي معاینې عکس العمل منفي هم وي. دا ډیری وختونه د کوچنیانو او په (HIV) اخته وگړو سره کيږي کوم چې له پخوا څخه د (TB) ناروغی باندې اخته وگړو څخه د یو چا سره وخت تیر کړی وي. دا ځکه چې دا ډول ډلې یا وگړي د (TB) میکروبونو لرلو وروسته د (TB) ناروغی د اخته کیدو خورا لوړ خطر کې دي.

کله چې خبره ستا د (LTBI) د درملني شي. نو بايد تا ډاکتر هره ورځ وگوري يا معاینه کړي. دا مهمه ده چې تاسو ته توسعه شوي درمل په سمه توگه استفاده شي. ډاکتر يا نرس به وگوري چې تاسو اوس څنگه یاست.

## د (LTBI) انتان درملني لپاره استفاده شوي درملو جانبی عوارض څه دي؟

ډیری وگړي کولی شي پرته له کومې ستونزې خپل د (LTBI) انتان درمل واخلې خو بیا هم په ځینې وخت کې جانبی اغیزې لري. ځینې جانبی اغیزې بې وړې وې. د مثال په توگه ریفامپین یا ریفایپنتین درمل ممکن د بدن مایع نارنجي رنگ کولو لامل شي لکه، لعاب، بولي اوبنکي، یا خوله، او د مور شیدي. بنایي د بدن څخه نارنجي مایعات وځي خو بې ضرره به وي. دا نورمال دی او رنگ ممکن د وخت په تیریدو سره له منځه ولاړ شي. ډاکتر یا نرس ممکن تاسو ته مشوره درکړي چې نرم لینزیا کالي مه اغوندئ ځکه چې دا ممکن د تل لپاره داغي شي. که چېرې تاسو په دې کې یو جانبی اغیزې ولری نو تاسو باید د درمل استفاده کولو یا اخیستلو ته دوام ورکړي.

که چرته تاسو جدي جانبی عوارض ولری نو باید ژر تر ژره ډاکتر یا نرس ته مراجعه وکړی. بنایي تاسو ته وویل شي چې د (LTBI) درمل بند کړی او یا هم د معایناتو تر سره کولو لپاره کلینک ته راشی. جدي جانبی اغیزې په لاندې ډول دي:

- « سر دردي يا د سره گرزېدل
- « اشتها له لاسه ورکول
- « زکام په څېر علايم
- « شديد اسهال يا بيکه رنگه غټي بولي
- « د ساه بندي
- « د خفگان احساس کول
- « تبه
- « غير ارادي وزن له لاسه ورکول
- « د بولو رنگ نصواري کېدل (لکه کافي يا کولا په څېر)
- « پوستکي او سترگي زيرېدل
- « د پوتکي چاودېدل يا خرابېدل
- « د لاسونو او پښو دوامداره پړسوب يا د پړسوب احساس
- « دوامداره ستریا يا ضعف 3 يا ډیرې ورځې دوام کوي
- « د معدې درد
- « په اسانۍ سره وینه بهېدل
- « د هډوکو درد
- « مغز
- « استفراک کول



تاسو باید د اوسني درملو لیست چمتو کړئ چې تاسو یې د خپل روغتیا پاملرنې کارکونکو ته ویسئ ترڅو د درملو تعاملاتو څخه مخنیوی وشي. ځینې (Contraceptives) (د زیږون کنټرول کولی) ممکن هم کار ونکړي کله چې تاسو د (TB) درمل استفاده کوئ. دا ځکه چې د (TB) درمل ځینې وختونه د زیږون کنټرول کولیو سره مداخله کولی شي او ممکن د زیږون کنټرول کولی غیر مؤثره کړي. که تاسو د زیږون کنټرول کولی استفاده کوئ، نو د کوم نوي درملو پیل کولو دمخه خپل ډاکټر سره مشوره وکړئ. د (TB) درملو د جاني اغېزو په اړه نورو معلومات د (CDC) د (TB) درملنه کې موندلې د ناوره پېښو پاڼه.

**څېړداری:** د الکولي مشروباتو څښل لکه شراب، بیر یا الکول، پداسې حال کې چې د (TB) درملو واخیستل شي خطرناک ثابتېدای شي. د نورو معلوماتو لپاره خپل ډاکټر یا نرس سره مشوره وکړئ.

هرڅوک چې (LTBI) لري باید د (TB) ناروغی علایم وپېژني. (وګورئ 8 پاڼه) که تاسو د (TB) ناروغی علایم لری. نو تاسو باید سمدستي یو ډاکټر ته مراجعه وکړئ.

ځینې وختونه د (LTBI) درملو اداره کولو کې مرستی ته اړتیا لري چې دوی یې باید واخلي. CDC د LTBI درملو تعقیب کونکي جوړ کړی ترڅو مریضان وکولی شي چې دوی (LTBI) درمل تنظیم او اداره کړي. پدې درملو تعقیب کونکو کې، د درملني مهالویشونو، درملو اخیستو، او ډاکټر/کلینیک تماس معلوماتو لیکلو لپاره ځای موجود دی. د نښو نښانونو یوچک لیست هم شته چې ممکن د (LTBI) درملو اخیستو پرمهال وده وکړي.

د درملو دري تعقیب کونکي لاندې ډول دي.

<p style="text-align: center;"><b>3</b></p> <p>درې میاشتي درمل هره ورځ ایسونازید پلس ریفامپین (Isoniazid plus Rifampin) (3HR) د (LTBI) انتان لپاره. چک لسټ (په انګلیسي کې)</p>	<p style="text-align: center;"><b>2</b></p> <p>4 میاشتو لپاره ریجیمین (4R) د (LTBI) انتان لپاره د درملو تعقیب کونکی - د درملو تعقیبونکی او د نښو چک لیست په انګلیسي کې شته.</p>	<p style="text-align: center;"><b>1</b></p> <p>دوږه ریجیمین 12 د (LTBI) انتان لپاره د درملو تعقیب کونکی - د درملو تعقیبونکی او د نښو چک لیست په انګلیسي، هسپانوي، ټاکالوک او ویتنامي ژبو کې موجود دي.</p>
--	---	---

د دې موادو ډاونلوډولو لپاره مراجعه وکړئ. CDC TB د زڼکری موادو پاڼه.

د LTBI په اړه د نورو معلوماتو لپاره، د CDC دې ویب پاڼو ته لار شئ:

« LTBI درملی لپاره (Regimens) »

« برېکړه وکړئ چې کله به د (LTBI) درملنه کوئ. »

« د (LTBI) درملنه د (Regimens) لنډمهاله کورس په واسطه »


## څه وکړم که زه د (HIV) انتان ولرم؟

که چرته تاسو ته د انتان لری نو باید ژر تر ژره ېې درملنه وکړه ترڅو د نه بچ پاتې شی. که چرته تاسو د (HIV) انتان لری نو باید ژر تر ژره ېې درملنه وکړه ځکه لکه څنګه چې LTBI ته ژر منتقل کیږي د دې نه زیات د HIV انتان TB ناروغی باندې بدلېږي. د خلکو په فکر (HIV) (LTBI) انتان (TB) ته تر ټولو زیات وده کونکي دی. ټول وګړي چې (HIV) لري نو ژر باید (LTBI) معاینه ترسره کړي. تر څو ژر تر ژره ېې درملنه وشي. (HIV) باندې اخته خلکو لپاره د (LTBI) درملنې ډیری اغیزمن رژیمونه شتون لري.

## که چرته ما کې (TB) معلوم شي. ایا زه (TB) ناروغي بل چا ته منتقلولی شم؟

که چرته تا د (TB) ناروغي لرونکي وګړي سره وخت تېر کړی وي نو ښایي ته د (TB) میکروب واخلې خو هماغه وخت به ېې بل چا ته خپور نکړی. یوازې د (TB) ناروغی لرونکی کولی شي د (TB) میکروب نورو وګړو ته خپور کړي. مخکې لدې چې تاسو نورو ته د (TB) میکروبونه خپور کړئ، تاسو ښایي د (TB) میکروبونو کې تنفس کړی وی نو. میکروبونه به ستاسو بدن کې تقسیم شي او د (TB) په ساری ناروغی باندې به اخته شي. او به داسې وخت کې ښایي تاسو د (TB) میکروبونه نورو ته خپور کړی.

په ځینو وګړو کې چې د (TB) میکروبونو کې تنفس کوي. نو د دوي بدن د میکروبونو مقاومت کوي ترڅو نورو خپربندو نه بچ وساتل شي. میکروبونه په بدن کې غیر فعال وي او ژوندي پاتې وي. خو وروسته یو وار بیا فعالیت پیلوي. دې ته (LTBI) وايي. هغه خلک چې (TB) (LTBI) میکروبونه نه خپروي. هغه خلک چې (LTBI) لري درملنې ېې کېدای شي او د (TB) ناروغی نه بچ کېدی شي.





## د (TB) د ناروغی درملنه څنگه تر سره کیږي؟

د (TB) ناوغانو لپاره یو ښه خبر دی! د دې درملنه د درملو په کارولو سره تقریبا هر وخت شونې ده. خو درمل باید د ډاکټه د هدایت په اساس استفاده شي.

که ته د (TB) ناروغي لري نو باید بېلا بېل د (TB) درمل واخلي. دا ځکه باید ستا بدن کې ټول میکروب مړه کړي. د (TB) بېلا بېل درمل کارول به ستا بدن کې سم کار وکړي ټول میکروب به مړه دي کړي او د (TB) درملو مقابل کې به پي مقاومت ته پریږدي. مقاومت معنی دا ده چې درمل نور نشي کولی چې میکروب مړه کړي.

د (TB) ناروغی لپاره عام استفاده شوي درمل په لاندې ډول دي.

« ایسونایزید (INH) Isoniazid

« ریفامپین (RIF) Rifampin

« ایټامبوتول (EMB) Ethambutol

« پیرزیناماید (PZA) Pyrazinamide

که تاسو د سرو یا ستوني د (TB) ناروغي لری، تاسو شاید ساري یاست. ته باید په کور کې پاتې شی مکتب او کار ته لار نشي تر څو د (TB) میکروب خپاره نکړی. او د درملو اخیستلو نه څو اونی وروسته ښایي جوړ شی او ساري نور هیڅ خپره نکړی. ستاسو ډاکټر یا نرس به تاسو ته ووايي چې کله مکتب او کار بېرته تگ پیل کړی.

د (TB) ناروغی باید تاسو د نورمال ژوند تېرولو څخه منغ نکړي. عام وگړي کولی شي چې د پخو ا په څېر خپل ژوند ته ادامه ورکړي. که ته چرته د ډاکټر یا نرس د لارښوني پر اساس درمل واخلي نو دا درمل به ژر ستا بدن کې د (TB) میکروب له منځه وېسي. او دا به تا د بیا مریضېدو څخه وژغوري.



## د (TB) درمل څه جانبی اغېزې لري؟

که ته چرته د TB ناروغی درمل اخلی نو باید د ډاکټر په لارښوونې عمل وکړی. د (TB) ناروغی شاید جانبی عوارض ولري. ځینې جانبی اغېزې یې وړې وي. خو ځینې نو ر جدي وي. که ته چرته جدي جانبی عوارض لري **نوسمدستي خپل ډاکټر ته مراجعه وکړی**. ښايي تاسو ته د TB درملو د نه اخیستلو وویل شي او یا درته د کیلینک ته ورتلو وویل شي. **جدي جانبی عوارض لاندې ډول دي:**

« د پوستکي خاړین	« استفراک کول
« پیکه یا د بدل لید	« د سترگو او پوټکي زیرېدل
« د معدې درد	« سر گرزېدل
« د بولو نسواري کېدل	« د خولې شاوخوا پرسوب یا بی حسې
« ستړیا	« په لاسونو او پښو کې د دوامداره پرسوب
« تبه درې ورځې یا ډېر وخت	احساس
« د زکام په څېر علایم	« د هډوکو درد
« د اشتهای ختمېدل	« په اسانۍ سره وینه بهېدل
« مغز	



ځینې جانبی عوارض **کمزوري** وي. د مثال په توګه، ریفامپین ممکن د بدن مایع نارنجي رنگ لامل شي لکه بولي، لعاب، اوبنګي، یا خوله، او د مور شیدې. ښايي د بدن څخه نارنجي مایعات وځي خو بی ضرره به وي. دا نورمال دی او رنگ ممکن د وخت په تیریدو سره له مینځه لاړ شي. ډاکټر یا نرس ممکن تاسو ته مشوره درکړي چې د نرم شیان مه اغوندي ځکه چې لینز ممکن د تل لپاره داغي شي. که چېرې تاسو په دې کې یو جانبی اغېزې ولری نو تاسو باید د درمل استفاده کولو یا اخیستلو ته دوام ورکړي.

هغه درمل چې د (TB) ناروغی درملني لپاره وړاندیز شوي ممکن د نورو درملو سره متقابل عمل وکړي. تاسو باید د اوسني درملو لیست چمتو کړئ چې تاسو یې د خپل روغتیا پاملرني کارکونکو ته ورکړي ترڅو د درملو تعاملاتو څخه مخنیوی وکړئ.

د مثال په توګه د (TB) ناروغی لپاره درمل کولی شي د شفاهي امیندواری (د زیرون کنټرول کولی) سره متقابل عمل وکړي او ممکن د زیرون کنټرول کولی ضعیفه کړي. پداسې حال کې چې تاسو د (TB) درمل اخلئ، اود زیرون کنټرول کولی هم کاروئ نو باید د خپل ډاکټر سره د زیرون بدیل کنټرول په اړه مشوره وکړئ. که تاسو د (TB) درملني پرمهال میتادون (د مخدره توکو اعتیاد درملني لپاره کارول کیږي) اخلئ، تاسو ممکن د وتلو علایم ولری. ستاسو ډاکټر یا نرس ممکن ستاسو د میتادون دوز تنظیم کولو ته اړتیا ولري.

تاسو کولی شئ چې د ټي بي درملني په اړه نورو معلوماتو لپاره [مراجعه وکړئ CDC TB](#): **ناوړه پیښو پاڼه**.

## ولې ما ته د (TB) ناروغي کې ډېر وخت د درملو اخیستو اړتیا ده؟

د (TB) میکروب ډېر ورو له منځه زی. د (LTBI) د انتان درملنه شاید درې میاشتې یا دې نه ډېر وخت ونیسي او دا په دې اثر لري چې ستاد (TB) میکروب څومره وخت نیسي.



د (TB) ناروغي درمل عموماً د 6 میاشتو څخه ډېر وخت نیسي چې د ټول د (TB) میکروب مړه کړي. ښایي ته د درملنې څخه یو څو اونۍ وروسته ښه احساس وکړي خو بیا صبر وکړه! د (TB) میکروب ستا بدن کې لا هم ژوندي دي حتی که ته د ښه والي احساس هم وکړي. ته باید خپلو درملو اخیستلو ته ادامه ورکړي حتی که ستا د (TB) میکروب مړه هم وي او هیڅ علامه هم ونلري.

ته ډېر خطر سره مخ کېدایښي که ته خپل درمل په سمه توګه استفاده نکړي. د (TB) میکروب به درکې نور هم وده وکړي او ته به د ډېر وخت لپاره د مریضۍ احساس کوي. ښایي د (TB) میکروب ستا د درملو مقابل کې مقاومت پیدا کړي. که چرته ستا پخواني درمل کار ونکړي نو ښایي ته ستا د (TB) درمل بدل کړل شي. او نوي درمل شاید د تا ته د ډېر وخت لپاره درکړي کوم چې عموماً ډېر جانبي عوارض لري.

که ستا مرض ساری شي نو ښایي ته دا خپل خپلوانو ملګرو او نور هغه څلو ته خپور کړي چې ته ورسره ډېر وخت تېروي. دا ډېره مهمه ده چې ټول درمل استعمال کړي څنګه چې ډاکټر درته خوندلي وي.

## (MDR TB) (multidrug-resistant) او (XDR TB) extensively (drug-resistant) څه ته وايي؟

بازې وختونو کې د (TB) میکروبوونه د (TB) ناروغي لپاره درملو مقابل کې مقاومت کوي. دا په دې معنی ده چې دغه درمل نور د (TB) درمل نشي مړه کولی.

د (MDR TB) د (TB) هغه میکروبوونو له امله رامنځته کېږي کوم چې د دوه مهمو درملو مقابل کې مقاومت کوي لکه isoniazid او rifampin.

د (MDR TB) د (XDR TB) یو جدي ډول ناروغي ده. د (XDR TB) د (TB) یو نادر ډول دی چې د نږدې ټولو درملو په وړاندې مقاومت لري کوم چې د (TB) درملنې لپاره کارول کېږي.

که تاسو د خپل ډاکټر یا نرس لخوا توسعه شوي درمل ژر وانه ځلی، نو د (TB) میکروب ممکن د ځینې درملو په وړاندې مقاومت پیدا کړي. همداراز هغه خلک چې د هغه چا سره وخت تیروي چې د (MDR TB) یا (XDR TB) ناروغ وي کولی شي د (MDR TB) میکروب واخلي.

(MDR TB) هغه خلکو کې ډېر عام دی کوم چې:

« چا چې د (MDR TB) لرونکو خلکو سره وخت ډېر تېر کړی وي.

« څو ک چې د ډاکټر یا نرس د هدايت پر اساس درمل نه اخلي.

« (TB) پکې وده وکړي وروسته له هغې نه چې د (TB) درمل ېې اخيستي وي.

« د هغه ځای نه راغلي وي کوم ځای کې چې (DR TB) عام وي.

هغه خلک چې (MDR TB) (XDR TB) ولري بايد خاص درملو سره ېې درملنه وشي. درملنه ېې شايد د عام (TB) ناروغی درملني څخه ډېر وخت واخلي او درمل ېې شايد جانيي عوارض ولري. د (XDR TB) او (MDR TB) ناروغی لرونکی بنيابي ډېر د مرگ په خطر کې ووسي. د (XDR TB) او (MDR TB) ناروغان ضرور بايد د (TB) متخصص سره اوگوري تر څو دوي پوه شي چې ايا دا کار کوي.

## (DOT) څه ته وايي؟

د درملو بڼه لاره دا ده. چې بايد مستقيم (DOT) واخلو دا په ځانگړي توگه (TB) درملني لپاره يو ريښتيني لار ده. که ته (DOT) واخلي نو ته به د روغتيا پاملرني کارکونکي هر ورځ وگوري. او يا هم اونې کې څو واري. تاسو به داسې ځای کې سره وگوري کوم ځای کې چې تاسو موافق ياستی. او دا به هم اليکټرونیکي يا (انلاين) ميتود له لاري وي ستاسو شخصي ناسته به هم شايد ستاسو کور کلينيک يا بل مناسب ځای کې تر سره شي. ته به خپل درمل داسې ځای کې واخلي چې ستا د روغتيا پاملرني کارکونکي به تا ته گوري. ځيني د (TB) برنامو واله اوس اليکټرونیکي ميتودونو نه کار اخلي. د (TB) او (LTBI) دواړه ناروغيو لپاره. بريښنايي (eDOT) د شخصي (DOT) لپاره بديل دی. که ستاسو په سيمه کې (eDOT) شتون ولري او تاسو د (eDOT) لپاره وړ ياست، د روغتيا پاملرني کار کونکی به تاسو د (TB) درمل په اخيستلو له لري څخه په سمارټ فون يا نورو ويډيو يا وړ بريښنايي وسيلو له لاري وگوري. (DOT) که په شخصي ډول وي يا د بريښنايي وسيلې کارول، تاسو سره په ياد ساتلو کې مرسته کوي چې خپل درمل واخلي او خپله درملنه بشپړه کړئ. او دا په دې معنی چې ته به ژر تر ژره جوړ شي.

د روغتيا پاملرني کارکونکي به هم داو تر لاسه کړي چې ايا د (TB) درمل په سمه توگه کاروی څرنگه چې پکار دي. دغه کس به جانيي عوارض هم وگوري او د هغې پوښتنې ځواب به درکړي چې کومه ته (TB) ناروغی په اړه ورڅخه لري.

حتی که (DOT) نه هم اخلي نو ته به ستا د درملني پر مهال په بېلابېلو وختونو کې د ډاکټرانو لخوا روزمره چپک يا وکتل شي تر څو دا تر لاسه شي هر څه په سمه توگه روان دي. دا به تر هغه دوام وکړي تر څو چې ته جوړ شوی نه ېې.



## زه څنگه ياد ساتلی شم چې زه بايد درمل واخلم که زه په (DOT) نه يم.

يواخينی لار ستا د رغېدو دا ده چې بايد دقيق د ډاکټر د هدايت په اساس درمل استفاده کړي. بنايي دا اسانه نه وي. که ته چرته (LTBI) لري نو دري يا دري مياشتو څخه زيات د (LTBI) درمل واخلي. که ته چرته د (TB) ناروغي لري نو بايد 6 مياشتو څخه زيات درمل واخلي.

روټين باندې عمل کول کولی شي تاسو په ياد ساتلو کې مرسته وکړي چې د لارښوونه پر اساس د (TB) درمل واخلي. دلته ځينې لارې شتون لري چې تاسو سره د درملو اخيستو يا استعمالولو په ياد ساتلو کې مرسته کوي که تاسو د (LTBI) درمل اخلي يا د (TB) ناروغي درمل.



« خپلې گولۍ په خپل وخت وخورئ مثلاً تاسو کولی شئ چې د سهار چای څښکلو نه مېنکې ېې واخلي او يا هم د غاښونو بورس کولو څخه وروسته.

« خپل د کورنۍ يو غړي ته ووايه چې د گولۍ خورل درياد کړي.

« هر ه ورځ جنټري کې نښه کوه چې تا گولۍ خورلي دي.

« د يو اونۍ لپاره خپلې ې گولۍ خپل باکس کې گډه کوم چې ته گولۍ شي په لاس کې ونيسي او يا هم جيب کې واچوي.

« د خپلو گوليو تنظيم او اداره کولو لپاره د درملو تعقيبونکي

وکاروئ. د (CDC) وېبپاڼه پرېنټ کېدونکي (LTBI) د درملو

کنټرولونکي لري. د (LTBI) د درملو کنټرولونکي داسې خالي

ځای لري چې تاسو کولی شئ هلته خپل د درملني نېټې د يو اونۍ

لپاره د کوليو شمار او د ډاکټر د کلينيک شمېره يا معلومات وليکئ. د درملو

تعقيب کونکي ډاونلوډولو لپاره مراجعه وکړه [CDC TB زدکړی موادو لپاره](#).

**نوبت:** په ياد ولره چې ټول درمل د کوچنيانو څخه لرې وساتي.

که چرته تا يوه ورځ خپل درمل قضاء کړل نو دغه دوز پرېږده او يو بل دوز پيل کړه. خپل ډاکټر ته ووايا چې ما نه يو دوز هېر شوی دی د نورو لارښوونو لپاره شايد ته خپل ډاکټر يا نرس سره خبره وکړي.

## ځنگه کولی شم چې د (TB) ناروغی خپریږو مخنیوی وکړم؟

تر ټولو مهم لاره د دې دا ده چې باید د (TB) درمل د ډاکټر د لارښوونې په اساس استفاده کړو. او ته باید د ډاکټرانو څخه وخت واخلي. ستا ډاکټر یا نرس باید تا وگورې چې اوس ته څنگه یې؟ دا هر وخت یو بلې د سپینې ایکسري کولو ته اړتیا لري او یا هم ستا د توخي بلغم باید وکتل شي. (بلغم چې د سږو له لاندې څخه توخیري) معاینات به معلوم کړي چې ایا درمل کار کوي که نه؟ معاینات دا هم معلوموي چې ایا د (TB) مېکروب خپریږونکي دي که نه. خپل د روغتیا پاملرنې کارکونکي هر هغه څه ووايا چې ناسم وي.



که ته چرته دومره د (TB) مریض یې چې شفاخانی ته اړتیا لري نو شاید ته به شفاخانی کې خاص کوټي کې بسټر شي. دا کوټي داسې یو هوا کش یا (air vent) لري چې نورو کوټو ته د (TB) مېکروب خپریږو ته نه پرېږدي. کوم خلک چې دې کوټي کې کار کوي نو هغوی به ماسکونه اچوي تر څو د (TB) ناروغي څخه محفوظ پاتې شي. ته باید په کوټه کې پاتې شي ترڅو د (TB) مېکروبو خپریږو څخه مخنیوی وشي.

که ته چرته د ساری ناروغه یې نو ته باید په بازي خبرو باندې عمل وکړي کوم چې نورو ته د خپریږو نه مخنیوی کوي:

« خپل درمل د لارښوونې پر اساس واخه. دا ډېر مهمه ده.

« همېشه خپله خوله د یو ټیشو په ذریعه پټه کړه کله چې ته توخیري خاندي یا پرنجی کوي. او دغه ټیشو یا دسمال باید له خان څخه لرې واچوي.

« د نور خلکو څخه خان لرې وساته. د کورنۍ نورو غړو څخه لرې ووده شه. خپل کور کې خلک مه پرېږده چې راشي.

« مکتب او کار ته هم مه زه.

« د کوټي یا تعمیر څخه بهر ووځه او هوا واخه. (که ډېره یخني نه وي) (TB) داسې ورو کوچني ځایونو کې خپریږي چرته چې هوا نه چلیږي. کوټه یو هوا کش یا اکزاز ولکوه چې هوا بهر راوباسي. بنیایي دغه هوا د مېکروبو څخه ډکه وي. که د خپلي کوټي سره نږدې ورسې لری هغه هم خلاصی کړه. دا به د دې فرصت کم کړي چې مېکروب خپاره شي ځکه دننه کومه هوا چې مېکروب لري او پاتې شوي وي راوځي.

په یاد ولره چې د (TB) ناروغي د هوا له لارې خپریږي. خلک د (TB) مېکروب د لاس ورکولو، په کمود کېناستلو او یا هم د لوڅو تبادلې څخه نه اخلي.



د دوه یا درې اونيو د درملو استعمال څخه وروسته بنایي ته مېکروب خپاره نکړي. سنا ډاکټر به تا ته ووايي چې کله باید ته کار او مکتب ته لاړ شی.

په یاد ولره ته به هلته جوړ شي کله چې ته درمل د ډاکټر د لارښوونې پر اساس استعمال کړي.

د هغه خلکو په اړه فکر وکړه چا چې تا سره شاید وخت تېر کړی وي. لکه د کورنی غړي، لنډ ملگري او همکاران. ځایي د روغتیا مرکز شاید د دوي د (TB) معاینه هم وکړي. ((TB) کوچنیانو او د هغه خلکو لپاره خطر لري چې په (HIV) اخته وي. که چرته دوي په (TB) مېکروبو باندې اخته وي نو دوی باید ژر تر ژره درمل واخلې تر څو د (TB) ناروغی ودی څخه وژغورل شي.

## نور د (TB) منبع.

د (LTBI) او (TB) ناروغی په اړه نورو معلوماتو لپاره (CDC) (TB) وپېیښي ته رجوع وکړی. دمریض (LTBI) او (TB) ناروغی په اړه مواد په ډیبري ژبو کې هم شتون لري په (CDC) (TB) د زدکړی د موادو پانه [Find TB Resources](#).

د TB حمایتي لپاره وګورئ [TB يو](#). (CDC) د هغو خلکو شخصي تجربې هم په ګوته کوي چې د (LTBI) او (TB) ناروغی تشخیص او درملنه یې شوي وي، په بېله بیا د TB کنترول متخصصینو کې کار کړی وي. مراجعه وکړی [CDC TB شخصي د قیصو](#) پانه د نورو معلوماتو لپاره





د نشرېدو نمبر: 301083

د نورو معلوماتو لپاره

او يا هم د TB موادو راغوبننلو لپاره

خپل ځايي روغتيايي مرکز سره اړيکه کي شی.

د ناروغيو کنترول مخنيوي مرکز

ملي د HIV/AIDS, Viral Hepatitis, STD, TB مخنيوي مرکز

د تېرکولو زو د ختمېدو ډيويژن

@CDCTB  @cdc\_TB 

[www.cdc.gov/tb](http://www.cdc.gov/tb)



**Centers for Disease  
Control and Prevention**  
National Center for HIV/AIDS,  
Viral Hepatitis, STD, and  
TB Prevention